



به نام خدا

بولتن مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - زمستان ۲۰۲۰

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، در حوزه های مختلف بهداشت باروری دارای مقالات ارزشمندی است.

Midwifery and Reproductive Health Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

☐ نمایش آمار سال جاری



زمینه های پژوهشی مقالات:



خلاصه ای از مهمترین نتایج مقالات زمستان ۲۰۲۰ به شرح زیر می باشد:

مقالات منتشر شده با افلیشین مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - زمستان ۲۰۲۰

صدیق و همکاران مطالعه ای با عنوان به حاشیه راندن مامایی در بارداری و زایمان پزشکی شده: یک مطالعه کیفی انجام دادند و مقاله ارزشمند این کار تحقیقاتی در مجله British Journal of Midwifery چاپ شد. این مطالعه با کمک تحلیل محتوا انجام شد و ۴۹ مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق انجام شد. نتایج نشان داد که نقش ماماها در مراقبت ها و همچنین بارداری های کم خطر کم رنگ شده است و این مسئله سبب به حاشیه راندن مامایی شده است و از طرفی پزشکی شدن بیش از حد بارداری و زایمان در این میان نقش پررنگی در به حاشیه راندن مامایی دارد.

Najmabadi KM, Tabatabaie MG, Vedadhir AA, Mobarakabadi SS. The marginalisation of midwifery in medicalised pregnancy and childbirth: a qualitative study. British Journal of Midwifery. 2020;28(11):768-76. <https://doi.org/10.12968/bjom.2020.28.11.768>.
<https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjom.2020.28.11.768>

بررسی ارتباط تعیین کننده های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک در مطالعه از گلی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و مقاله این کار مرور سیستماتیک در مجله زنان، مامایی و ناباروری به چاپ رسید. در این مطالعه مروری مقالات فارسی و انگلیسی از نوع مشاهده ای (کوهورت، مورد شاهدهی، مقطعی) در پایگاه های مختلف کلمات کلیدی مرتبط با "تعیین کننده های اجتماعی سلامت (Social determinants of health)" و "اضافه وزن باقی مانده پس از زایمان (postpartum weight retention)" به دست آمده از MESH در سال های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ جستجو شدند. انتخاب مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفیت مقالات با مقیاس نیوکاسل اوتاوا انجام شد و نهایتاً ۸ مقاله براساس اهداف پژوهش وارد شدند. نتایج مرور سیستماتیک حاضر بیانگر تأثیر تعیین کننده های اجتماعی ساختاری و بینایی سلامت - از جمله تحصیلات زنان و عواملی در حیطه های رفتاری، بیولوژیکی و روانی اجتماعی - بر باقی ماندن اضافه وزن پس از زایمان بود. این امر مؤید نیاز به توجه بیشتر مسئولان و پرسنل بهداشتی به این عوامل تأثیرگذار در کنار سایر عوامل پزشکی می باشد تا بتوان به پیشگیری یا کاهش میزان این معضل و عوارض ناشی از آن کمک نمود.

Bazzazian S, Riazi H, Mahmoodi Z, Nasiri S, Ozgoli G. Relationship between Social Determinants of Health and Postpartum weight retention in Iran Based on the WHO Model: A Systematic Review. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020;23(8):87-106. Doi:10.22038/ijogi.2020.17302. https://ijogi.mums.ac.ir/article_17302.html?lang=en

سیمبر و همکاران رابطه بین خودپنداره جنسی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان را مورد بررسی قرار دادند و مقاله این پژوهش در مجله International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences (IJWHR) به چاپ رسید. این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۲۰ زن انجام شد. به طور کلی، تصویر بدن رابطه مثبتی با خودپنداره جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان دارد و پیش بینی کننده مهمی برای سلامت جنسی و رفتارهای این گروه محسوب می شود. بر این اساس، مداخلات روانشناختی، همراه با مامایی و مشاوره های جنسی توسط پرسنل آموزش دیده می تواند به توانمندسازی این بیماران کمک کند.

Gooran S, Simbar M, Hajian S, Nazarpour S, Nasiri M, Martin J. The Relationship Between Sexual Self-concept and Mental Body Image in Women With Breast Cancer. INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMEN'S HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES, [online]. 2020;8(4):383-8. DOI: 10.15296/ijwhr.2020.61
<http://ijwhr.net/text.php?id=545>

روانشنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند توسط احمدی و همکاران در مجله زنان، مامایی و نازایی مشهد به چاپ رسید. نسخه فارسی نهایی بعد از تعیین روایی صوری و محتوی، توسط ۲۰۰ پدر در انتظار فرزند واجد معیارهای ورود به مطالعه

مراجعه کننده جهت کنترل بارداری همسرانشان، تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار سازه ابزار از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ و آزمون مجدد بررسی گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل را نشان داد که شامل علائم جسمانی و علائم روانی با ۱۳ گویه در هر عامل بود. این دو عامل ۴۹٪ کل واریانس پاسخها را تبیین می کند. شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی پیشنهاد کردند که الگوی دو عاملی بهترین برازش را برای داده ها فراهم کرده است. با در نظر گرفتن نقطه برش ۱/۵ برای تأثیر آیتام تمامی سوالات در روایی صوری کمی مورد تأیید قرار گرفت. نسبت و شاخص روایی محتوا به ترتیب ۰/۶۴ و ۰/۹۲ بود. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۰/۸۵ و ضریب همبستگی درون خوشه ای ۰/۸۸ به دست آمد. نتایج روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سندرم کووید برنان، نشان دهنده پایایی و اعتبار مطلوب این ابزار در تشخیص سندرم کووید در پدران در انتظار فرزند می باشد.

Ghavami SF, Kariman N, Ahmadi M, Navinejhad M, Rezanejad P. Psychometrics analysis of Bernan Couvade Syndrome Questionnaire in Fathers Expecting a Child. 2020; 23(7):47-58. 10.22038/ijogi.2020.17078. https://ijogi.mums.ac.ir/article_17078_a11491396f5529a800459133b87d262c.pdf?lang=en

حاجیان و همکاران مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهی انجام دادند و مقاله این کار در مجله زنان، مامایی و نازایی مشهد به چاپ رسید. این مطالعه مورد شاهی گذشته نگر در سال ۱۳۹۶ بر روی ۲۴۰ زن مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی شهر تهران انجام گرفت. گروه مورد زنان مبتلا به سرطان آندومتر و گروه کنترل زنان غیرمبتلا به سرطان آندومتر بودند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، باروری، سوابق پزشکی و اطلاعات مربوط به سرطان آندومتر انجام شد. نتایج نشان داد که زنان مبتلا به سرطان آندومتر دوره شیردهی کوتاه تری داشتند، لذا آموزش شیردهی باید مورد توجه مراقبت های پس از زایمان قرار گیرد.

Yeganeh Z, Sheikhan Z, Hajian P, Esteki T, Nasiri M, Khodakarami N. Relationship between duration of breast feeding and endometrial cancer: a case-control study. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020; (23) 8:58-65. 10.22038/ijogi.2020.17295. https://ijogi.mums.ac.ir/article_17295.html?lang=en

علم الهدی و همکاران مقاله ای با عنوان تأثیر مصرف اسیدهای چرب ترانس پایین بر پره اکلامپسی: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده انجام دادند و مقاله این کار ارزشمند در مجله Journal of Research in Medical Sciences، چاپ شد. مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۸۰۰ زن باردار انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف اسیدهای چرب ترانس پایین بر پره اکلامپسی موثر است و تفاوت بین گروه های مصرف اسیدهای چرب با ترانس پایین و بالا معنی دار است.

Alamolhoda SH, Simbar M, Mirmiran P, Mirabi P. Effect of low trans-fatty acid intakes on preeclampsia: A randomized controlled trial. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2020;25:112. doi: 10.4103/jrms.JRMS_149_19 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8067888/>

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجربه زایمان (P-CEQ) توسط پازنده و همکاران در مجله Biomed Research International، به چاپ رسید. این مطالعه بر روی ۲۵۰ زن یک تا سه ماه بعد از زایمان انجام شد. روایی محتوی، صوری و تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. یافته ها حاکی از روایی صوری و محتوی مناسب ابزار بود. در تحلیل عاملی تأییدی، $RMSEA = 0.05$ ، $SRMSR = 0.06$ ، $CFI > 0.93$ ، $\chi^2/df = 1.80$ شاخص های برازش مناسب بودند و مدل تأیید شد. ضریب همبستگی درون خوشه ای ابزار ۰/۸۸ و آلفای کرونباخ ۰/۸۵ بوده است. این پرسشنامه یک ابزار معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی تجربیات زایمان است. این پرسشنامه می تواند برای ارزیابی کیفیت مراقبت از نظر تجربه زایمان زنان مورد استفاده قرار گیرد.

Kazemi S, Dencker A, Pazandeh F, Montazeri A, Sedigh-Mobarakabadi S, Hajian S. Psychometric Evaluation of the Persian Version of the Childbirth Experience Questionnaire (CEQ). BioMed Research International. 2020;1-7. <https://doi.org/10.1155/2020/6879283>. <https://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2020/6879283.pdf>

ناهییدی و همکاران مقاله ای با عنوان دیدگاه متخصصان زنان و ماماها در مورد انتظارات زنان باردار: مطالعه تحلیل محتوا، انجام دادند و در مجله Iranian Journal Nursing and Midwifery Research چاپ کردند. این مطالعه کیفی بر روی ۱۰ نفر از ارائه دهندگان خدمات انجام شد. نتایج دو طبقه اصلی ارائه مراقبت های مناسب قبل از تولد (مهارت های حرفه ای، مهارت های ارتباطی و ویژگی فردی) و مراکز مناسب بارداری و زایمان (پرسنل - امکانات و سیستم مدیریت) بوده است.

Hajifoghaha M, Nahidi F, Simbar M, Nasiri M. The viewpoint of Iranian gynecologists and midwives on the expectations of pregnant women: A content analysis study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2020;25(5):419. doi: 10.4103/ijnmr.IJNMR_182_19. <https://www.ijnmrjournal.net/article.asp?issn=1735-9066;year=2020;volume=25;issue=5;spage=419;epage=425;aulast=Hajifoghaha>

اثر کرم Commiphora Mukul، در یک مطالعه کارآزمایی بالینی و دو سو کور در بهبود احتقان پستان زنان شیرده توسط ناهییدی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه بر روی ۱۰۰ زن در دو گروه پلاسبو و کرم Commiphora Mukul انجام شد و پرستار ۸ بار در روز به مدت دو روز کرم را روی سینه افراد مالید و شدت اریتم، التهاب و درد توسط چک لیست معتبر بررسی شد. نتایج نشان داد که دو روز پس از مداخله تفاوت بین گروه ها معنی دار است. کرم Commiphora Mukul در بهبود احتقان پستان موثر است.

Zolala S, Mojab F, Nahidi F, Khabazkhoob M, Nasiri M. A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial, Evaluating the Efficacy of Commiphora Mukul Cream in Improving Breast Engorgement in Breastfeeding Women. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;16(1):61-72. DOI:10.22034/IJPS.2020.111889.1592. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Double-Blind%2C-Randomized%2C-Placebo-Controlled-the-Zolala-Mojab/18de1d490bf00ce48937078d363aa4c2b8ee3f69>