



به نام خدا

بولتن مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری- پاییز ۲۰۲۲

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اکنون دارای ۱۸ اندیکس می باشد.

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقالات بین‌المللی | مقالات | هیات علمی | معرفی | خلاصه عملکرد

Scopus Profile

بهروز شده در: ۱۴۰۹/۰۲/۲۱



خلاصه ای از مهمترین نتایج مقالات پاییز ۲۰۲۲ به شرح زیر می باشد:

مقالات منتشر شده با افلیشین مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری- پاییز ۲۰۲۲

کریمان و همکاران دقت تشخیصی بیومارکرهای متعدد سه ماهه اول و اوایل بارداری برای پیش‌بینی دیابت بارداری در مطالعه ای بررسی کردند. نتایج این تحقیق ارزشمند در مجله BMC Pregnancy and Childbirth با ایمپکت ۳/۲ چاپ گردید. در این مطالعه ۶۰۰ زن باردار بررسی شدند. به طور کلی، یافته های این مطالعه نشان داد که استفاده همزمان از داده‌های اندازه‌گیری مکرر بر روی هموگلوبین، هموگلوبین، FBS و RBC در سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم بارداری ممکن است به عنوان یک ابزار قابل قبول برای پیش‌بینی GDM در بارداری مورد استفاده قرار گیرد.

Shaarbaf Eidgahi E, Nasiri M, Kariman N, Safavi Ardebili N, Salehi M, Kazemi M, Zayeri F. Diagnostic accuracy of first and early second trimester multiple biomarkers for prediction of gestational diabetes mellitus: a multivariate longitudinal approach. BMC Pregnancy and Childbirth. 2022 Dec;22(1):1-8.

موانع و تسهیل‌کننده‌های مشارکت مردان ایرانی در مراقبت‌های پری‌ناتال در یک مطالعه کیفی توسط حاجیان و همکاران مورد بررسی قرار گرفت که یافته‌های مطالعه در مجله *Reproductive Health*. از سری مجلات BMC، چاپ شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی پدیدارشناختی بود که نمونه‌گیری زنان باردار یا زنانی که به تازگی زایمان کرده‌اند (یک هفته تا شش ماه پس از زایمان)، همسران، سیاست‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات مامایی) به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. نتایج نشان داد که مردان در شرکت در مراقبت‌های پری‌ناتال با مکانیسم دوگانه‌ای روبرو هستند که برخی از این عوامل می‌تواند مشارکت آنها را تسهیل کند و برخی دیگر می‌تواند آن را کاهش دهد. مشارکت مردان در مراقبت‌های دوران بارداری تحت تأثیر انگیزه‌های خاص، محدودیت‌های خاص و برخی نگرش‌های اقتدارگرایانه جنسیتی قرار دارد.

Hajian S, Mehran N, Simbar M, Alavi Majd H. The barriers and facilitators of Iranian men's involvement in perinatal care: a qualitative study. *Reproductive Health*. 2022 Dec;19(1):1-9.

آموزش پدران برای بهبود شیوه‌های تغذیه انحصاری با شیر مادر: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده توسط دکتر سیمبر و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این مطالعه در مجله *BMC health services research* چاپ شده است. این یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی ۷۶ پدر که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. نتایج نشان داد که تحصیلات پدر باعث بهبود عملکرد مادران در شیردهی و افزایش سرعت و تداوم شیردهی انحصاری با شیر مادر می‌شود.

Panahi F, Rashidi Fakari F, Nazarpour S, Lotfi R, Rahimizadeh M, Nasiri M, Simbar M. Educating fathers to improve exclusive breastfeeding practices: a randomized controlled trial. *BMC health services research*. 2022 Dec;22(1):1-2

ازگلی و همکاران ترجمه و روان‌سنجی پرسشنامه غربالگری اختلال خوردن (SCOFF) را به زبان فارسی انجام دادند و نتایج تحقیق در مجله *Journal of eating disorders* به چاپ رسید. در مجموع ۳۱۰ دانشجوی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرسشنامه غربالگری اختلال خوردن را تکمیل کردند. روایی صوری، محتوا، معیار و سازه نسخه فارسی SCOFF مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی و پایایی نسخه فارسی SCOFF بررسی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج نشان داد که ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار مناسب می‌باشد که استفاده از آن را به عنوان یک پرسشنامه معتبر در غربالگری اختلالات خوردن پیشنهاد می‌کند.

Bazzazian S, Ozgoli G, Kariman N, Nasiri M, Mokhtaryan-Gilani T, Hajiesmaello M. The translation and psychometric assessment of the SCOFF eating disorder screening questionnaire: the Persian version. *Journal of eating disorders*. 2022 Dec;10(1):1-9

ابراز کیفیت زندگی زنان پس از زایمان (MPQOL-I) در یک مطالعه ترکیبی توسط کریمان و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه اکتشافی به روش ترکیبی متوالی در دو مرحله انجام شد. مرحله اول توسعه MPQOL-I و مرحله دوم ارزیابی روانسنجی انجام شد. روایی صوری، محتوا، سازه، همگرا و پایایی مورد آزمون قرار گرفت. MPQOL-I شامل ۵ سواله ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی کیفیت زندگی پس از زایمان است. در این مطالعه، ۵ عامل از طریق تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شد: (۱) حمایت دریافتی، (۲) روابط جنسی، (۳) پیوند با نوزاد، (۴) شیردهی و مراقبت از نوزاد و (۵) دوره گذار. این عوامل ۵۳/۲۶ درصد از کل واریانس را به خود اختصاص دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که شاخص‌های برازش قابل قبول است. همچنین، همسانی درونی و شاخص پایایی ترکیبی عوامل بیشتر از ۰/۷ بوده است.

Mokhtaryan-Gilani T, Kariman N, Nia HS, Doulabi MA, Nasiri M. The Maternal Postpartum Quality of Life Instrument (MPQOL-I): development and psychometric evaluation in an exploratory sequential mixed-method study. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2022

Dec;22(1):1-2.

ازگلی و همکاران بررسی پیش بینی کننده های ارتباط بین مدت زمان ابتلا به سرطان پستان و میزان مراقبت با نیازهای حمایتی بیماران و کیفیت زندگی مراقبین انجام دادند و یافته ها در مجله *Supportive Care in Cancer*، به چاپ رسید. این مطالعه توصیفی بر روی ۱۵۰ بیمار و مراقبان بود. داده ها با استفاده از فرم کوتاه بررسی نیازهای مراقبت های حمایتی (SCNS-SF34)، مقیاس شاخص کیفیت زندگی مراقبت کننده-سرطان (CQOLC) و یک چک لیست اجتماعی-دموگرافیک جمع آوری شد. سپس داده ها در نرم افزارهای SPSS-24 و Lisrel-8.8 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مطالعه حاضر به ارائه مراقبت های جامع، برنامه ریزی برای ارائه مراقبت های حمایتی و مشاوره به بیماران و خانواده آنها، به ویژه زمانی که طول مدت بیماری طولانی تر می شود، تاکید کرد.

Attari SM, Mahmoodi Z, Mohammadzadeh Nimekari M, Nasiri M, Ashouri Taziani Y, Ozgoli G. Predictors of the relationship between the duration of cancer and care time with the supportive care needs of patients and the quality of life of their caregivers: a path analysis. *Supportive Care in Cancer*. 2022 Nov;30(11):8935-45.

بررسی مقایسه ای میزان ابتلاء به افسردگی، استرس و اضطراب در دو گروه زنان فرزنددار و بدون فرزند: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در مطالعه ازگلی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه مقطعی در سال ۱۴۰۰ بر روی ۵۸۱ زن متأهل غیرباردار واجد شرایط از ۳۱ استان کشور انجام شد. نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به صورت الکترونیک و در فضای مجازی انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک، کیفیت خواب، رضایت زناشویی (EMS)، حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، وضعیت اقتصادی اجتماعی (قدرت نما) و استرس-اضطراب-افسردگی (DASS-21) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (SPSS نسخه ۲۲) و آزمون های تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک دوجبهی انجام شد. داشتن فرزند، نه تنها استرس و اضطراب زنان را افزایش نمی دهد، بلکه نقش محافظت کننده در مقابل افسردگی دارد، لذا به نظر می رسد تشویق به فرزندآوری می تواند سبب ارتقاء سلامت روان زنان جامعه ایران شود.

Bayat, F., Ozgoli, G., Mahmoodi, Z., Nasiri, M. A comparative study of depression, stress, and anxiety in two groups of women with and without children: a population-based study. *The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility*, 2022; 25(7): 45-58. doi: 10.22038/ijogi.2022.21135