



به نام خدا

بولتن مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - پاییز ۲۰۲۳

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۳۳۶ مقاله و اچ اندیکس ۲۰ می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- مقالات بین‌المللی
- مقالات
- هیات علمی
- معرفی
- خلاصه عملکرد پژوهشی

Scopus Profile

بهروز شده در: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

خلاصه عملکرد پژوهشی Scopus



خلاصه ای از چند مقاله برتر در پاییز ۲۰۲۳ به شرح زیر می باشد

مقالات منتشر شده با افلیشین مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری-پاییز ۲۰۲۳

سیمبر و همکاران در تحقیقی ارزشمندی ارزیابی رفتارهای خود مراقبتی زنان برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ در تهران ۱۳۹۹ انجام دادند و یافته ها در مجله PLOS ONE چاپ شد. این مطالعه برای ارزیابی خودمراقبتی زنان در پیشگیری از COVID-19 انجام شد. در این مطالعه که بر روی ۴۰۳ زن ساکن تهران در سال ۱۴۰۰ انجام گرفت، نشان داده شد که ۷۱ درصد از معیارهای خودمراقبتی توسط زنان انجام می شود و بیشترین امتیاز مربوط به استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی بود. بعلاوه رابطه معنی داری بین خودمراقبتی زنان در پیشگیری از کرونا با استرس، اضطراب، نگرانی، ترس سن و تعداد فرزندان آنان نشان داده شد. لذا آموزش خودمراقبتی برای زنان جوانتر با فرزندان بیشتر توصیه می شود. مزید بر اینکه ترویج برنامه خودمراقبتی می تواند سلامت روان زنان را در پاندمی بیماری های واگیر از جمله کووید-۱۹ بهبود بخشد.

Nazarpour S, Simbar M, Rashidi Fakari F, Khorrami M, Dodel Andarvar K, Jafari Torkamani Z, Keyvanfar S, Alavi Majd H. Women's self-care for Coronavirus prevention and the related factors in Iran: A cross-sectional study. Plos one. 2023 Nov 30;18(11):e0294983.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0294983>

ناهیدی و همکاران ارتباط تصویر تناسلی و عملکرد جنسی زنان: یک مطالعه مرور سیستماتیک مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق ارزشمند در مجله Aesthetic Surgery Journal با ایمپکت ۳/۱ چاپ شد. ادراکات و احساسات در مورد اندام تناسلی تحت تاثیر تجربیات درونی و بیرونی افراد شکل می گیرد. مطالعه حاضر تا حدی توانست به این سوال راهگشا پاسخ دهد، بین تصویر تناسلی با عملکرد جنسی ارتباطی وجود دارد با انجام متآنالیز، جهت و میزان این ارتباط تا حدودی مشخص شد.

Alavi-Arjas F, Goodman MP, Simbar M, Majd HA, Sharp G, Nahidi F. The Effect of Female Genital Cosmetic and Reconstructive Procedures on Body and Genital Self-Image: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aesthetic Surgery Journal. 2023 Apr 20:sjad109.
<https://academic.oup.com/asj/article-abstract/43/10/1161/7133185>.

سیمبر و همکاران طراحی بسته خدمات ارتقای رفتارهای خود مراقبتی زنان سنین باروری تهران مبتنی بر تحلیل وضعیت رفتارهای خود مراقبتی را در قالب یک طرحی تحقیقاتی به پایان رساندند و یافته های این مطالعه در مجله BMC Women's Health چاپ شد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خود مراقبتی زنان در سنین باروری ساکن شهر تهران با استفاده از ابزاری معتبر و پایا جهت تعیین نیازهای سلامت زنان مبتنی بر دستورالعمل های جهانی سلامت زنان برای ترویج خود مراقبتی زنان در سنین باروری در شهر تهران بود. ۱۰۵۱ زن در سنین باروری ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران پرسشنامه روا و پایای خود مراقبتی زنان در سنین باروری را برای دو گروه سنین باروری ۱۹ تا ۳۹ سال (۲۹ سواله)، ۴۰ تا ۵۵ سال (۳۶ سواله) در حیطه های سلامت جسمی، روانی-اجتماعی، جنسی و باروری و آزمایشات دوره ای و غربالگری که بر اساس دستورالعمل های معتبر جهانی سلامت زنان طراحی و به طور جداگانه اعتبار سنجی شدند را تکمیل کردند. تقریباً نیمی از زنان خود مراقبتی انجام می دهند و کمترین درصد میانگین نمره خود مراقبتی مربوط به حیطه سلامت روانی-اجتماعی و سپس در بعد سلامت باروری و جنسی بود. درصد میانگین نمرات در بعد جسمانی و آزمایشات دوره ای و غربالگری بالاتر سایر بخش ها بود اما در حیطه جسمانی ۵۰ درصد زنان و در بخش آزمایشات دوره ای و غربالگری ۳۰ درصد زنان همچنان با چالش روبرو بودند. یافته ها حاکی از چالش ۵۰ درصدی در رفتار خود مراقبتی زنان در سنین باروری شهروند تهران بود. بیشترین چالش مربوط به خود مراقبتی در حیطه سلامت روان

اجتماعی و حیطة سلامت باروری-جنسی بود. بسته اقدامات برنامه ترویج سلامت باروری مبتنی بر نیاز در چهار حیطة خود مراقبتی سلامت جسمی، روانی- اجتماعی، باروری-جنسی و غربالگری و آزمایشات دوره ای و با تاکید بر دو اولویت اول یعنی سلامت روان اجتماعی و سلامت باروری جنسیدر کشور ایران مورد نیاز است.

Simbar M, Kiani Z, Nasiri Z, KhodaKarami N, Nazarpour S, Fakari FR, Keyvanfar S, Majd HA. The self-care situation analysis of reproductive-aged women in Tehran: a survey study. *BMC Women's Health*. 2023 Nov 25;23(1):624. <https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-023-02763-9>

کارکرد جنسی یکی از موضوعات مهم حوزه سلامت جنسی می باشد که در زمان بحران کرونا کمتر مورد توجه گرفته است. کشاورز و همکاران در قالب گزینت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طرحی با عنوان سلامت باروری-جنسی زوجین در اپیدمی کووید-۱۹: یک مطالعه تلفیقی انجام دادند و یافته ها در مجله *Coronaviruses* به چاپ رسید. این مطالعه مقطعی بر روی ۱۱۰ زن مبتلا به کرونا قبل و بعد از یک ماه از اتمام قرنطینه در یک درمانگاه شبانه روزی و یک مرکز ۲۴ ساعت ریفرال کووید شهر پاکدشت، تهران، ایران از اوایل سال ۱۳۹۹ تا اواخر سال ۱۴۰۰ انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اختلال عملکرد جنسی زنان بوده است. با توجه به شیوع کووید نمونه گیری هدفمند بود و پرسشنامه به شیوه الکترونیک تکمیل گردید. با توجه به کاهش نمرات زنان کارکرد جنسی بعد از ابتلا به کرونا، این حوزه نیازمند توجه جدی است. آموزش زنان و همسران در زمان پاندمی های مشابه مورد تاکید قرار گیرد و قبل از بروز حوادث مشابه برنامه ریزی مناسب انجام شود تا از اثرگذاری سو در بلند مدت جلوگیری شود.

Keshavarz Z, Shariatifar N, Nasiri M, Kiani Z. Comparison of Women's Sexual Activity Before and After being Infected with COVID-19. *Coronaviruses*. Published on: 18 December, 2023. <https://www.eurekaselect.com/article/136717>.

زهرا کیانی و همکاران بررسی شیوع علائم افسردگی در مردان نابارور: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متآنالیز در قالب یک طرح تحقیقاتی به اتمام رساندند و یافته های این مقاله در مجله *BMC Public Health* با ایمپکت فاکتور ۴/۵ به چاپ رسید. این مرور سیستماتیک و فراتحلیل، مبتنی بر نتایج کلیه مقالاتی انجام در این زمینه بود که از میان کلیه پایگاههای اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام شدند. بیست و دو مطالعه در بخش سیستماتیک این مطالعه گنجانده شد و ۸ ابزار اندازه گیری مختلف برای شناسایی افسردگی استفاده شد. سپس بر اساس امکان متآنالیز، ۱۸ مطالعه در ۴ مطالعه وارد شدند. نتایج نشان داد شیوع کلی افسردگی در مردان نابارور ۱۸/۳۰ درصد است و کمترین و بیشترین شیوع کلی افسردگی در مردان به ترتیب، ۱۴/۰۴ درصد و ۲۳/۶۳ درصد در مقیاس های افسردگی زونگ (ZDS) و مقیاس استرس اضطراب افسردگی (DASS) ابزار، به ترتیب بر وارد شده بود. شیوع کلی افسردگی در مردان نابارور ۱۸/۵۵ درصد و ۱۶/۷۵ درصد بود که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، شیوع قابل توجه افسردگی در مردان نابارور نیاز به توجه و برنامه ریزی خاص دارد که به عنوان یک متغیر پنهان توصیه می شود که برنامه های آموزشی برای ارائه دهندگان مراقبتهای مربوط به سلامت باروری زوجها به منظور استفاده مؤثر از ابزارهای تشخیصی در این زمینه خاص ایجاد شود و بر اهمیت ارزیابی سلامت روان مردان، به ویژه از نظر افسردگی، در طول درمان های ناباروری دقت بیشتری مبذول گردد.

Kiani Z, Fakari FR, Hakimzadeh A, Hajian S, Fakari FR, Nasiri M. Prevalence of depression in infertile men: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2023 Oct 11;23(1):1972. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-023-16865-4>

خشونت خانگی بر علیه زنان و پاندمی کووید-۱۹ توسط علم الهدی و همکاران بررسی شد و یافته های این طرح در مجله

Current Women s Health Reviews به چاپ رسید. مطالعه حاضر نشان داد که در دوران همه گیری کرونا و قرنطینه سازی، میزان خشونت خانگی بر علیه زنان افزایش یافت و این افزایش خشونت خانگی در طول همه گیری کووید-۱۹، آسیب های فراوانی را برای زنانیکه در خانه های خشونت آمیز زندگی می کردند، به همراه خواهد داشت. ما به برنامه هایی با هدف پیشگیری از اعمال خشونت خانگی علیه زنان، مانند تربیت کارمندان چند رشته ای، از جمله روانشناس، سکسولوژیست و روانپزشک بالینی، نیاز داریم.

Roobahani S, Dolatian M, Mahmoodi Z, Zandifar A, Majd HA, Shams J. Investigating the Relationship Between Structural Determinants of Health and Domestic Violence against Pregnant Women based on the World Health Organization Model. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2023 Dec 31. <https://brieflands.com/articles/ijpbs-130911.html>.