

به نام خدا

بولتن مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - بهار ۲۰۲۶

مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۴۲۸ مقاله و ۳۱ اندیکس می باشد.

Scopus Profile

بهروز شده در: ۱۴۰۵/۳/۲۴

خلاصه عملکرد مقالات Scopus



خلاصه ای از چند مقاله برتر در بهار ۲۰۲۶ به شرح زیر می باشد:

مقالات منتشر شده با افلیشین مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری - بهار ۲۰۲۶

دکتر معصومه سیمبر و همکاران در پروژه ای ارتباط عوامل روانی-اقتصادی با افسردگی پس از زایمان در نبود عوارض پزشکی مهم برای مادر و نوزاد: یک مرور نظام مند و متاآنالیز بررسی کردند و نتایج این طرح ارزشمند در مجله BMC Pregnancy and Childbirth چاپ شد. افسردگی پس از زایمان (PPD) یک اختلال خلقی مهم است که در دوران پس از زایمان بر مادران تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط عوامل روانی-اقتصادی با افسردگی پس از زایمان در مادرانی بدون عوارض پزشکی مهم برای خود و نوزاد انجام شد. این پژوهش به صورت مرور نظام مند و متاآنالیز بر اساس ۳۲ مطالعه (۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳) انجام گرفت. نتایج نشان داد سابقه افسردگی و استرس دوران بارداری از قوی ترین عوامل خطر PPD هستند. همچنین درآمد پایین و بارداری ناخواسته با افزایش خطر افسردگی مرتبط بودند. در مقابل، حمایت اجتماعی و به ویژه حمایت همسر نقش محافظتی داشتند و اشتغال مادر یا همسر نیز خطر PPD را کاهش می داد. به طور کلی، عوامل روانی و اقتصادی نقش مهمی در بروز افسردگی پس از زایمان دارند.

Yazdkhasti M, Kalhor M, Simbar M, Hajian S, Kiani Z, Amirian A, Ebrahimi E, Mohammadi N, Ezadi Z, Jafari M. The association of psycho-economic factors with postpartum depression

without significant medical complications for the mother and infant: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth. 2026 Feb 23.
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-026-08799-7>

دکتر علم الهدی و همکاران تحلیل مسیر مقطعی از تعیین‌کننده‌های اجتماعی رفتارهای پیشگیری از عفونت‌های مقاربتی (STI) به‌کارگیری چارچوب سازمان جهانی بهداشت (WHO) انجام دادند و نتایج در مجله Scientific Reports چاپ شد. عفونت‌های مقاربتی (STIs) همچنان یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی هستند و رفتارهای پیشگیرانه می‌توانند از بروز آن‌ها جلوگیری کنند. این مطالعه مقطعی روی ۳۸۴ زن ۱۸ تا ۴۵ ساله در تهران انجام شد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌هایی درباره سواد سلامت جنسی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، خشونت جنسی، نگرش‌های فرهنگی و رفتارهای پیشگیری از STI جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد میانگین رفتارهای پیشگیری در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد. تحلیل مسیر نشان داد سواد سلامت جنسی، تحصیلات بالاتر و سن بیشتر در زمان ازدواج با رفتارهای پیشگیرانه بهتر مرتبط هستند. در مقابل، نگرش‌های فرهنگی محدودکننده تأثیر منفی بر این رفتارها داشتند و بهبود آموزش و تغییر نگرش‌ها برای ارتقای پیشگیری ضروری است.

Vakili F, Masoumi M, Valiey F, Asadi F, Nasiri M, Jahanfar S, Hamzehgardeshi Z, Alamolhoda SH. A cross-sectional path analysis of the social determinants of STI preventive behaviors: application of the WHO framework. Scientific Reports. 2026 Feb 26.
<https://www.nature.com/articles/s41598-026-41367-9>

دکتر ناهیدی و همکاران عوامل مؤثر و رضایت از تصویر بدن و ناحیه تناسلی در زنانی که تحت جراحی زیبایی ناحیه تناسلی قرار می‌گیرند: یک مطالعه تصادفی و مقطعی بررسی کردند و یافته‌ها در مجله Aesthetic Plastic Surgery چاپ شد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر و میزان رضایت از تصویر بدن و ناحیه تناسلی در زنانی که تحت جراحی زیبایی ناحیه تناسلی قرار گرفته بودند یا متقاضی آن بودند. شرکت‌کنندگان به گروه‌هایی شامل متقاضیان و انجام‌دهندگان لابیپلاستی، جراحی‌های متعدد و گروه کنترل تقسیم شدند. در مجموع ۲۰۰ زن از مراکز درمانی تهران در مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه‌های ارزیابی تصویر بدن و تصویر ذهنی از ناحیه تناسلی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد زنانی که جراحی انجام داده بودند، تصویر مثبت‌تری از بدن و ناحیه تناسلی خود داشتند. همچنین افرادی که متقاضی جراحی بودند، تصویر ذهنی منفی‌تری نسبت به گروه کنترل و افراد جراحی‌شده داشتند. رسانه‌های آنلاین، شریک جنسی و پزشکان از عوامل مهم تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری برای انجام جراحی بودند. در مجموع، رضایت پس از جراحی در زنان و شرکای آن‌ها بالا گزارش شد.

Nahidi F, Payne E, Alavi-Arjas F, Simbar M, Majd HA, Silverio SA. Influencing Factors and Satisfaction with Body and Genital Image in Women Undergoing Genital Cosmetic Surgery: A Randomized, Cross-Sectional Study. Aesthetic Plastic Surgery. 2026 Mar;50(5):2092-104.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-025-05120-3>

دکتر ازگلی و همکاران بارداری در سایه کووید-۱۹: یک مطالعه کیفی را انجام دادند و نتایج در مجله Health Expectations چاپ شد. بارداری یک دوره خاص است که می‌تواند تحت تأثیر رویدادهای محیطی قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی درک مادران از بارداری در دوران پاندمی کووید-۱۹ انجام شد. پژوهش به روش کیفی و تحلیل محتوا انجام گرفت و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته آنلاین با ۱۶ مادر باردار و پس از زایمان در ایران (قبل از دسترسی به واکسن در سال ۲۰۲۱) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد زنان با وجود شرایط پاندمی، تصمیم قبلی خود برای بارداری را ادامه داده و آن را آگاهانه انتخاب کرده بودند. مراقبت‌های دوران بارداری در این دوره ویژگی‌های خاصی داشت و استفاده از مراقبت‌های تله‌هلت و پیوسته به مادران کمک کرد با چالش‌ها بهتر کنار بیایند. همچنین بارداری در دوران کووید-۱۹ تجربه‌ای همراه با تنش‌های روانی و تغییرات مختلف در شرایط مراقبتی بود. در مجموع، این دوران تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای مادران ایجاد کرد که می‌تواند در بحران‌های آینده مورد

Ozgoli G, Mobarakabadi SS. Pregnancy in the Shadow of Covid-19: A Qualitative Study. *Health Expectations*. 2026 Feb;29(1):e70558.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.70558>

دکتر ناهیدی و همکاران اثرات عملکرد جنسی زنان پس از لابیپلاستی: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز بررسی کردند و مقاله در مجله *Aesthetic Plastic Surgery* چاپ شد. لابیپلاستی معمولاً با اهداف زیبایی، جنسی یا عملکردی انجام می‌شود، اما نتایج آن در مطالعات مختلف متفاوت و گاهی متناقض گزارش شده است. این مرور نظام‌مند با هدف بررسی تأثیر لابیپلاستی بر عملکرد جنسی زنان انجام شد. در این پژوهش، ۱۱ مطالعه شامل ۶۷۱ شرکت‌کننده بررسی و متاآنالیز انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت مطالعات اغلب ضعیف تا متوسط بوده و شواهد قوی محدود است. با این حال، تحلیل متاآنالیز ۶ مطالعه نشان داد که پس از لابیپلاستی، نمره عملکرد جنسی (FSFI) حدود ۱۸.۸٪ بهبود یافته است. در مجموع، لابیپلاستی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود عملکرد جنسی شود، اما به دلیل محدودیت‌های روش‌شناختی، نتایج قطعی نیست و باید قبل از جراحی به بیماران اطلاعات کامل داده شود.

Nahidi F, Goodman MP, Alavi-Arjas F, Simbar M, Majd HA, Rastegar F. Female sexual function after labiaplasty: a systematic review and meta-analysis. *Aesthetic Plastic Surgery*. 2026 Jan;50(1):447-60. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-025-04946-1>

دکتر دولتیان و همکاران تحلیل تماتیک باورهای غذایی در دوران بارداری: یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی (متاسنتز) و یافته‌ها در مجله *Ecology of Food and Nutrition* منتشر شد. این مرور نظام‌مند با هدف بررسی باورهای غذایی زنان در دوران بارداری انجام شد. نتایج نشان داد این باورها تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شکل می‌گیرند و می‌توانند بر تغذیه مادر اثر بگذارند. در این مطالعه ۴۴ پژوهش کیفی بررسی شد و یک تم اصلی با عنوان «باورهای اجتماعی-فرهنگی غذایی در بارداری» استخراج گردید. این باورها شامل دانش، سنت‌ها، تابوهای غذایی، حمایت اجتماعی و موانع مختلف بودند. در مجموع، نتایج نشان داد برای بهبود تغذیه مادران باردار، باید به زمینه فرهنگی و نقش خانواده و جامعه توجه شود.

Rashidi F, Dolatian M, Kiani Z, Sharif-Nia H, Haghighian-Roudsari A. Thematic Analysis of Pregnancy Food Beliefs: A Systematic Review and Meta-Synthesis. *Ecology of Food and Nutrition*. 2026. 12:131. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03670244.2026.2675991>